

Indikatorer og standarder for Dansk Sarkom Database



Indikatorområde	Indikator	Type	Standard
Udredningsmodalitet	1a. Andel af patienter, hvor en MR eller CT af tumor udføres hos patienter med subfasciel tumor.	Proces	Mindst 95%
	1b. Andel af patienter, hvor en CT af thorax eller PET/CT hos patienter med intermediært og høj maligne tumorer udføres.	Proces	Mindst 95%
	1c. Andel af patienter, hvor en knoglescintigrafi eller PET/CT ved knogletumorer hos patienter med intermediært og høj maligne tumorer udføres.	Proces	Mindst 95%
Tilstrækkelig kirurgisk margin	2. Andel af patienter, der ikke skal foretage re-resektion pga. utilstrækkelig kirurgisk margin.	Resultat	Højst 10%
Postoperativ strålebehandling	3. Andel af patienter der efter operation fik strålebehandling, påbegynder strålebehandling inden 60 dage efter operationsdato.	Proces	Mindst 80%
Klinisk kontrol indenfor 180 dage	4. Antal af patienter, der kommer til første klinisk kontrol efter afsluttet behandling indenfor 180 dage	Proces	Mindst 90%
Lokal recidiv indenfor 5 år.	5a. Andel af sarkopatier der får lokalt recidiv indenfor 5 år skarp	Resultat	Højst 20%
Fjernmetastase indenfor 5 år	5b. Andel af sarkopatier der får fjernmetastase indenfor 5 år skarp	Resultat	Højst 30%